


FICHE TECHNIQUE D'UTILISATION ANDROLIS & TAURRUS PRO ®

*Lutte biologique contre le « pou rouge » *Dermanyssus gallinae**

La cible des prédateurs ANDROLIS & TAURRUS PRO® :

Ces prédateurs sont efficaces contre *Dermanyssus gallinae*, connu sous le nom de « pou rouge » et très fréquent en élevage de volailles. Ces prédateurs s'attaquent à tous les stades du parasite, avec une préférence pour les jeunes stades (les œufs, larves et nymphes).



Quand lâcher les prédateurs ?

Il est impossible de déterminer précisément la quantité de poux rouges présents dans un élevage. Quand on observe des individus gavés de sang et se mettant en grappe, le niveau d'infestation est déjà élevé. Des oiseaux nerveux, se piquant, se grattant de façon anormale et répétée, anémiés, un affaiblissement, une ponte perturbée peuvent aussi être des signes d'infestation.

Un simple mouchoir ou une feuille blanche laissés quelques jours coincés dans un recoin, à proximité d'un nid, peuvent permettre de confirmer la présence du parasite.

Les prédateurs peuvent être utilisés dès l'apparition des premiers poux rouges.

En cas de forte infestation (présence de multiples grappes de taille importantes), il conviendra d'effectuer au préalable un nettoyage de ces grappes (pulvérisation locale ou élimination mécanique).

Comment utiliser les prédateurs ANDROLIS & TAURRUS PRO ® ?

Localiser les zones à risques

Le pou rouge pique la poule quand elle se repose, car il ne vit pas sur elle. Il profite donc des moments où la poule ne bouge pas pour effectuer son repas de sang. Les zones à risques où les infestations sont généralement visibles et qu'il faut traiter en priorité sont principalement : Les nids, les caillebotis et les perchoirs.

La mise en œuvre de la lutte biologique consiste à libérer les prédateurs à proximité des zones infestées. Idéalement, les prédateurs seront versés sur un support : paille, air de grattage, fientes, goulotte etc... Lorsque ces substrats sont absents il convient des flacons pour libérer progressivement les prédateurs sur la zone à traiter (ci-dessous).

Lâcher les prédateurs :

ANDROLIS : préfère les zones humides : fientes, substrat, flacons

TAURRUS : s'acclimate dans des zones plus sèches : nids, tapis, bois, structure – On ne place jamais TAURRUS dans les bouteilles ou flacons, il faut les disperser de manière homogènes dans le bâtiment (zone plus sèche).

A réception des prédateurs :

- 1) Agiter délicatement pendant quelques secondes les seaux pour homogénéiser leurs contenus (prédateurs sur un support minéral inerte)
- 2) Verser sur, ou, à proximité des zones infestées le contenu des seaux – Les bouteilles ou flacons peuvent être utilisés comme diffuseurs de prédateurs. Les bouteilles sont remplies uniquement avec de l'ANDROLIS



Protection des perchoirs



Clip pour les volières

- 3) Réparti de manière homogène les prédateurs ANDROLIS et TAURRUS sur les zones citées ci-dessus
- 4) **FLACONS OU BOUTEILLES** : (1) uniquement avec de l'ANDROLIS (2) fixer à la structure à l'aide de 2 colliers plastiques ou du clip bouteille (3) percer l'opercule sur le bouchon pour libérer les prédateurs (4) remplacer les bouteilles après 8 semaines ou jeter après 12 semaines en cas de non remplacement.

PROTOCOLE & FREQUENCE DE LÂCHERS :

PROTOCOLE DE LÂCHER élevage REPROS – PLEIN AIR ET BIO



PROTOCOLE DE LÂCHER élevage VOLIERES

